

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA KOLONOSKOPII preparatem Fortrans

- Na badanie kolonoskopii należy **zgłosić się 30min** przed planowaną godziną badania **z osobą towarzyszącą!**
- Tego dnia po badaniu nie wolno prowadzić samochodu.
- Na tydzień przed badaniem należy **odstawić leki wpływające na krzepliwość krwi** (np. Acard, Polocard, Acenocumarol, aspiryna) najlepiej pod kontrolą lekarza prowadzącego.- W przypadku pobrania wycinków do badania histopatologicznego wyniki można odebrać po **ok. 14 dniach roboczych tylko na podstawie opisu badania** wydanego przez lekarza po badaniu.

KROK 1

Do badania kolonoskopii całe jelito powinno być prawidłowo oczyszczone, aby tak było należy zastosować odpowiednią dietę.

48 godzin przed badaniem: dieta ubogoresztkowa, lekkostrawna - ryż, makaron, bulion, chleb (bez nasion), gotowane mięso i ryby, przecedzone soki, herbata.

Nie należy spożywać: owoców zawierających drobne pestki (np. winogrona, kiwi), mleka, kawy, barwiących soków (np. buraczane).

24 godziny przed badaniem: nie wolno już jeść, tylko dieta płynna - woda, herbata, przecedzony bulion, klarowane soki

Osoby chorujące na cukrzycę mogą np. pić słodzone napoje bądź kisiel bez cząstek.

KROK 2

W celu dobrego oczyszczenia jelita grubego należy zastosować preparat przeczyszczający FORTTRANS.

OPCJA 1`: Badanie odbywa się w godzinach porannych tj. między 7:00 a 12:00.

W dniu poprzedzającym badanie, około godziny 16:00 należy przygotować 4litry roztworu Fortrans, rozpuszczając każdą z 4 torebek w 1litrze niegazowanej wody. Przygotowany roztwór należy wypić w przeciągu 4-6 godzin, 1 szklanka co około 15minut.

OPCJA 2`: Badanie odbywa się w godzinach porannych tj. między 13:00 a 18:00.

– W dniu poprzedzającym badanie, około godziny 18:00 należy przygotować 2litry roztworu Fortrans, rozpuszczając 2 z 4 torebek każdą w 1litrze niegazowanej wody. Przygotowany roztwór należy wypić w przeciągu 2 godzin, 1 szklanka co 15 minut.

– W dniu badania, około 6:00 rano należy przygotować 2litry roztworu Fortrans, rozpuszczając pozostałe 2 torebki preparatu Fortrans, każdą w 1litrze niegazowanej wody. Przygotowany roztwór należy wypić w przeciągu 2 godzin, 1 szklanka co 15 minut.

WODĘ MOŻNA PIĆ DO SAMEGO BADANIA !

W przypadku kiedy badanie wykonywane jest w **znieczuleniu ogólnym** w dniu badania (6 godzin przed badaniem) **nie wolno już pić płynów!**

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA KOLONOSKOPII preparatem Citra Fleet

- Na badanie kolonoskopii należy **zgłosić się 30min** przed planowaną godziną badania **z osobą towarzyszącą!**
- Tego dnia po badaniu nie wolno prowadzić samochodu.
- Na tydzień przed badaniem należy **odstawić leki wpływające na krzepliwość krwi** (np. Acard, Polocard, Acenocumarol, aspiryna) najlepiej pod kontrolą lekarza prowadzącego.- W przypadku pobrania wycinków do badania histopatologicznego wyniki można odebrać po **ok. 14 dniach roboczych tylko na podstawie opisu badania** wydanego przez lekarza po badaniu.

KROK 1

Do badania kolonoskopii całe jelito powinno być prawidłowo oczyszczone, aby tak było należy zastosować odpowiednią dietę.

48 godzin przed badaniem: dieta ubogoresztkowa, lekkostrawna - ryż, makaron, bulion, chleb (bez nasion), gotowane mięso i ryby, przecedzone soki, herbata.

Nie należy spożywać: owoców zawierających drobne pestki (np. winogrona, kiwi), mleka, kawy, barwiących soków (np. buraczane).

24 godziny przed badaniem: nie wolno już jeść, tylko dieta płynna - woda, herbata, przecedzony bulion, klarowane soki

Osoby chorujące na cukrzycę mogą np. pić słodzone napoje bądź kisiel bez cząstek.

KROK 2

W celu dobrego oczyszczenia jelita grubego należy zastosować preparat przeczyszczający CITRAFLEET.

OPCJA 1`: Badanie odbywa się w godzinach porannych tj. między 7:00 a 12:00.

- O godzinie 15:00 dzień przed badaniem należy rozpuścić jedną saszetkę preparatu CITRAFLEET w 150ml zimnej wody, ciągle mieszając przez 2-3minuty. Roztwór należy wypić natychmiast po przygotowaniu i popić szklanką wody.

- O godzinie 21:00 dzień przed badaniem należy przyjąć drugą porcję preparatu.

OPCJA 2`: Badanie odbywa się w godzinach porannych tj. między 13:00 a 18:00.

- O godzinie 21:00 dzień przed badaniem należy rozpuścić jedną saszetkę preparatu CITRAFLEET w 150ml zimnej wody, ciągle mieszając przez 2-3minuty. Roztwór należy wypić natychmiast po przygotowaniu i popić szklanką wody.

- O godzinie 06:00 w dzień badania należy przyjąć drugą porcję preparatu.

PO KAŻDEJ Z TYCH SASZETEK NALEŻY WYPIĆ MINIMUM 2 LITRY WODY NIEGAZOWANEJ !!!!

WODĘ MOŻNA PIĆ DO SAMEGO BADANIA !

W przypadku kiedy badanie wykonywane jest w **znieczuleniu ogólnym** w dniu badania (6 godzin przed badaniem) **nie wolno już pić płynów!**

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA REKTOSKOPII

- Na tydzień przed badaniem należy **odstawić leki wpływające na krzepliwość krwi** (np. Acard, Polocard, Acenocumarol, aspiryna) najlepiej pod kontrolą lekarza prowadzącego.
- W przypadku pobrania wycinków do badania histopatologicznego wyniki można odebrać po **ok. 14 dniach roboczych tylko na podstawie opisu badania** wydanego przez lekarza po badaniu.

48 godzin przed badaniem: dieta ubogoresztkowa, lekkostrawna - ryż, makaron, bulion, chleb (bez nasion), gotowane mięso i ryby, przecedzone soki, herbata.

Nie należy spożywać: owoców zawierających drobne pestki (np. winogrona, kiwi), mleka, kawy, barwiących soków (np. buraczane).

24 godziny przed badaniem: nie wolno już jeść, tylko dieta płynna - woda, herbata, przecedzony bulion, klarowane soki

Osoby chorujące na cukrzycę mogą np. pić słodzone napoje bądź kisiel bez cząstek.

W celu oczyszczenia odbytnicy należy wykonać dwie lewatywy np. ENEMA, RECTANAL.

1' dzień przed badaniem w godzinach wieczornych.

2' w dniu badania w godzinach porannych.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA GASTROSKOPII

- Na tydzień przed badaniem należy **odstawić leki wpływające na krzepliwość krwi** (np. Acard, Polocard, Acenocumarol, aspiryna) najlepiej pod kontrolą lekarza prowadzącego.
- Na dwa tygodnie przed badaniem należy **odstawić leki antyrefluksowe** (np. Controloc, Helicid, IPP, Omopolprazol) najlepiej pod kontrolą lekarza prowadzącego.
- W przypadku pobrania wycinków do badania histopatologicznego wyniki można odebrać po **ok. 14 dniach roboczych tylko na podstawie opisu badania** wydanego przez lekarza po badaniu.

Do badania gastroskopii żołądek powinien być pusty, aby tak było należy na **6-8 godzin przed badaniem należy już nic nie jeść i nie pić.**